

農業と科学

CHISSO-ASAHI FERTILIZER CO LTD

1990
11

ササニシキ中苗育苗における ロングの利用効果

宮城県農業センター土壤肥料部

主任研究員兼作物栄養科長 武田良和

1. はじめに

健苗ほど移植後の不良環境条件に対する抵抗力が強く、安定性に優っているため、昔から「苗半作」と言われている。本県でも、健苗育成と適期田植えとを、稲づくりの基本技術として指導の徹底を図っているところである。

本県における健苗としての目安は、表-1に示すとおりである。さらに苗の栄養条件としては、窒素濃度が4%程度は確保されていることが、活

苗の窒素濃度を4%以上に維持し、かつ徒長させない苗作りのためには、温度・水管理のほか、施肥の面でも細心の注意が必要である。

この点、被覆肥料は肥効期間が長く、追肥による窒素供給量の調整も不要で、窒素養分の過不足も少ない等、本県の中苗育苗には適した利点があると考えられた。

そこで、ロング(100日タイプ)を利用することによって、中苗育苗期間の追肥を省略し、速効

表-1 苗の種類別の目標値

| 項目 | 苗の種類 | 稚苗 | 中苗 | 中～成苗 (成形ポット) |
|-------------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 苗 形 質 | 草丈 (cm) | 10～15 | 13～18 | 15～20 |
| | 第1葉鞘長 (cm) | 3～4 | 2～3 | 2～3 |
| | 葉数 (葉) | 2.1～2.5 | 3.5～4.0 | 3.5～5.0 |
| | 地上部乾物重 (g/100本) | 1.2以上 | 2.1以上 | 3.5～5.0 |
| | 充実度 (地上部乾物重/草丈) | 1.0以上 | 1.5～2.0 | 2.0以上 |

着良化のためには必要と考えられる。

一箱あたりの播種量は、乾籾で稚苗160g、中苗100g、施肥量は窒素・リン酸・加里成分量が、それぞれ稚苗2g、中苗1.5gを基準としている。

追肥は葉色に注意して、稚苗では1.5葉期頃、中苗では1.5葉期及び2.5葉期の2回に、窒素成分で箱あたり1gを施用するよう指導している。

中苗育苗では、育苗センターや規模の大きい個人の場合には、追肥の労力もかなりのものとなる。

加えて本県では育苗期間の気象変動が大きく、

本号の内容

- § ササニシキ中苗育苗における
ロングの利用効果……………(1)
宮城県農業センター 土壤肥料部
主任研究員兼作物栄養科長 武田良和
- § 水稻に対する緩効性被覆肥料(LP100, LP100s)
を利用した全量基肥施肥技術……………(6)
その1 理想的窒素吸収パターンとシュミレーションについて
山形県農業試験場 化学部
主任専門研究員 上野正夫

性肥料追肥の苗と同等以上の苗質を有する健苗の育成が可能ではないかと考え、試験を実施した。

その結果、本県における中苗育苗に最も適したロング利用施肥法を確立できた。以下に、結果の概要を紹介する。

2. 試験方法

(1) 育苗法

- ① 供試品種 ササニシキ
- ② 播種日 平成1年4月12日
- ③ 播種量 100g/箱(乾糶換算)
- ④ 床土 水田土(強粘質, 3.3kg/箱)
- ⑤ 無加温出芽(パイプハウス, ベタ掛け)

(2) 試験区の構成

表-2のとおり。1区3連制。

表-2 試験区の構成

| 区番号 | 試験区名 | 速効性成分量 (g/箱) | | | 緩効性成分量 (g/箱) | | |
|-----|-----------|--------------|-----|-----|--------------|------|------|
| | | 窒素 | リン酸 | 加里 | 窒素 | リン酸 | 加里 |
| 1 | 普通化成無追肥区 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 普通化成追肥区 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ロング5g区:b | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.3 | 5.0 |
| 4 | ロング5g区:c | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 4.3 | 5.0 |
| 5 | ロング7g区:b | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
| 6 | ロング7g区:c | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
| 7 | ロング10g区:a | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10.0 | 8.6 | 10.0 |
| 8 | ロング10g区:b | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 8.6 | 10.0 |
| 9 | ロング10g区:c | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.0 | 8.6 | 10.0 |
| 10 | ロング14g区:a | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14.0 | 12.0 | 14.0 |
| 11 | ロング14g区:b | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 |
| 12 | ロング14g区:c | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.0 | 12.0 | 14.0 |

注) 普通化成は窒素・リン酸・加里各10%

普通化成追肥区には硫酸で窒素1gつつを4月24日及び5月2日に施用
ロング各区のa, b, cにはそれぞれ普通化成を併用

3. 結果と考察

(1) 苗の生育

図-1に播種後35日(育苗終了時)の苗草丈の処理区間における相違を示した。横軸は表-2の試験区番号である(以下の各図共通)。

区番号2が普通化成基肥に硫酸2回を追肥した区であり、慣行育苗法に相当し、対照区とする。

各区ともに、表-1に示した中

図-1 育苗終了時の苗草丈




図-2 草丈の播種後の推移





図-3 育苗終了時の苗地上部乾物重



苗の草丈目標値の範囲に入っている。しかし、4, 11, 12の各区はやや伸びすぎの傾向で、充実度(図-4)も低下したので好ましくない。

区番号3, 5, 8, 11は速効性窒素1.0gで、ロング肥料の窒素がそれぞれ5, 7, 10, 14gである。

すぎる傾向となった。

ロング窒素10g施用では草丈も対照区に優り、かつ徒長傾向もなく、速効性肥料施用量の影響も少なかった。

苗地上部乾物重も、草丈と同様の傾向であった。

この場合、ロングの施用量が多いほど、草丈は伸長する傾向がみられ、ロングの窒素14gではその傾向が顕著であった。

また、図-2に播種後経過日数と草丈の推移を示したが、ロング施用量が同一の場合、速効性肥料施用量の多いほうが草丈は伸長し、初期の生育の違いがその後の生育に影響を及ぼしたものと考えられる。しかし、ロング10g施用区では速効性肥料施用量による差は極めて小さかった。

播種19, 35日後と生育が進むに従って、対照区と比較して草丈は伸長する傾向が認められた。

ロング窒素5, 7gでは、速効性肥料窒素1.0gのときの草丈は対照区(2区)よりも短く、1.5gに増量するとやや伸び

が(図一3)、草丈の傾向に比較して、速効性肥料施用量の増加による乾物重増加は大きくない。

このことは、速効性窒素施用量が増加すると、やや徒長傾向となったためと考えられる。

この傾向は速効性肥料窒素1.5gに、ロング窒素14g施用した場合には顕著であった。

乾物重を草丈で除した値、即ち単位長さ(1cm)当たりの重さを充実度といい、苗の形質を判断する指標としている。徒長することなく、ガッシリとして重い健苗ほど充実度が高く、中苗では1.5~2.0が目標値である。

試験結果は図一4に示したが、ロング窒素の施用量が多いほど、上昇する傾向がある。しかし、ロング施用量が同一の場合は、速効性窒素の施用量が増加すると顕著に低下する傾向を示している。

ロング窒素10g施用区では、この傾向は小さく速効性肥料窒素施用量の影響が比較的少ない結果となった。

対照2回追肥区を基準としてみると、区番号5, 8, 10, 11がほぼ同等


か優る傾向であった。

しかし、乾物重及び後述する苗の窒素濃度などを考慮すると8, 11区の苗質が、より優れていると考えられる。


(2) 苗の栄養状態

育苗終了時の苗窒素濃度は4%を目標としている

図一4 育苗終了時の苗充実度



図一5 育苗終了時の苗地上部窒素濃度



るが、図一5に示したように対照施肥区(2区)及び速効性窒素1.5g+ロング窒素7g以上の区で、この値を超えていた。

ロング10g施用区は速効性窒素の施用量の影響が小さく、3区ともに苗窒素濃度は4%以上となっているが、乾物重及び充実度の結果では、速効性窒素1.0g区が良い結果となっている。

育苗終了時の地上部養分吸収量を表一3に示す。

窒素吸収量は育苗中期以降はロング区が対照区より優り、育苗終了時ではロング窒素10g以上の区で対照区よりも優った。

表一3 育苗終了の時養分吸収量

| 区番号 | 試験区名 | 吸収量 (mg/100本) | | |
|-----|-----------|------------------|----|----|
| | | 窒素 | 磷酸 | 加里 |
| 1 | 普通化成無追肥区 | 63 | 25 | 27 |
| 2 | 追肥区 | 91 | 29 | 31 |
| 3 | ロング5g区:b | 70 | 25 | 31 |
| 4 | " " :c | 83 | 32 | 41 |
| 5 | ロング7g区:b | 84 | 28 | 37 |
| 6 | " " :c | 89 | 29 | 38 |
| 7 | ロング10g区:a | 96 | 27 | 38 |
| 8 | " " :b | 97 | 31 | 38 |
| 9 | " " :c | 97 | 33 | 41 |
| 10 | ロング14g区:a | 103 | 31 | 41 |
| 11 | " " :b | 113 | 33 | 41 |
| 12 | " " :c | 106 | 30 | 40 |

苗の磷酸、加里の濃度・吸収量でも、育苗終了時でロング施用区が対照区よりも優り、ロング施用量の多い方がやや高い傾向であった。ロング施用量間の関係は、窒素で最も明瞭であり、加里、磷酸の順で不明瞭となっていた。肥料成分の溶出特性を反映したものと考えられる。

(3) 溶出割合

床土内最高気温は播種後約10日間24℃以上の高温で経過したため、この間に50%程度の窒素成分の溶出がみられた。また、播種9日後から35日後までの溶出は、窒素で13%であり、磷酸、加里はこの間の溶出が極めて僅かであった。

(4) 本田における生育及び収量

6月中旬(8葉期頃)まではロング施用区の生育が優ったが、減数分裂期には差が見られなくなった。養分吸収量は、ロング窒素10g以上施用区では、各養分ともに対照区に比べて優り、収量もロング施用区がいずれも優った。

(5) まとめ

ロングは肥効期間が長く、中苗育苗における追肥の省略が可能であるが、初期生育促進のため速効性肥料を上乗せして施用する必要がある。

ロング窒素を7gとすると、慣行並の苗が得られるものの、苗窒素濃度がやや低い。田植時の苗窒素濃度目標値を4%を確保し、徒長させずに健苗を得るためには、ロング窒素10gの施用が適当と判断された。

なお、育苗肥料の相違が生産費へ及ぼす影響を試算すると、追肥に本県でかなり使用されている液肥を施用した場合には、速効性肥料+2回追肥の施肥法でもロング施用と大差のない肥料代となったが、硫酸追肥ではロングの方がコスト高であった。しかし、追肥の労力を労働費として計上すると、ロング施用によるコスト上昇分はほぼ減殺された。

平成2年度は、速効性肥料を配合したロング肥料及び山土使用の場合も検討したが、特に問題はなく、このまま適用拡大が可能と判断された。

ロングの利点は肥効が長期継続することであるが、このことは徒長させ易い欠点ともなるので、緑化終了以降の温度管理及び水管理には特に注意を促している。