

飼料稲の有望品種と栽培法

(独) 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター

低コスト稲育種研究東北サブチーム長 山 口 誠 之
東北飼料イネ研究チーム主任研究員 関 矢 博 幸

1. はじめに

2009年8月に公表されたわが国の2008年の食料自給率は、熱量ベースで41%であった。これは、主要先進国の中では最低の水準であり、飼料自給率に至っては26%と、さらに低いのが現状である。農林水産省では、新たな「食料・農業・農村基本計画」(2005年策定)の中で、飼料自給率を2015年までに35%に上げる目標を掲げている。

一方で、わが国の米の消費量は1962年以降、食生活の欧米化とともに年々減少し続けている。その結果、食用米の作付面積は大幅に減少し、麦、大豆等への転作が進められている。しかし、水田での生産には水稲が最も適していることから、近年、飼料自給率の向上につながる飼料稲生産に期待が高まっている。

飼料稲は、牛用に子実と茎葉の全てを利用する「稲ホールクロップサイレージ(稲WCS)」と、主に豚、鶏用に子実のみを利用する「飼料米」に分けることができる。ここでは、現在までに育成された稲WCS用、飼料米用の飼料稲品種の特性を紹介するとともに、飼料稲品種の省力的で低コストな栽培法について報告する。

2. わが国の主な飼料稲品種

わが国の飼料稲品種改良の歴史をさかのぼると、当初は農林水産省が1982年から実施した「超多収プロジェクト」の中で食用、加工用を視野に入れた多収米として品種改良が進められていた。それ以降、いくつかの多収品種が育成された。2000年以降、本格的に稲WCSの生産が始まり、それと連動するように乾物収量が高く、倒れにくい専用品種が次々に育成された。さらにこれらの多収品




図1. 飼料稲品種の栽培適地

(W：稲WCS用，米：飼料米用，無印：兼用)

種、稲WCS用品種の中でより玄米収量が高いものが飼料米用として利用されるようになった。

2009年までに育成された主な飼料稲品種を図1に示した。北海道向けから九州向けまで、育成品種数は20を超え、今後も収量性などが改良された新たな飼料稲品種が育成される見込みである。

3. 東北地域向けの飼料稲品種

ここでは、特に東北地域で普及している3品種「べこあおば」、「べこごのみ」、「ふくひびき」について詳しく紹介する。

1) 「べこあおば」(中込ら2006)：2005年育成、交配組合せ：オオチカラ／西海203号

東北地域中南部で「ひとめぼれ」と同熟期の“中生の晩”に属する。玄米は極大粒で、主食用品種との識別性がある(写真1)。倒伏に強く、直播栽培に適している(写真2)。稲WCSとして、黄熟期のTDN(可消化養分総量)収量は「ふ




写真1. 「べこあおば」(上)と「ひとめぼれ」(下)の穂



写真2. 直播栽培での「べこあおば」の草姿
(秋田県大仙市)

くひびき」よりも1割程度多収である。飼料米として、粗玄米収量750~800kg/10aが期待できる。2007年に秋田県大仙市で1,014kg/10a(施肥量:窒素成分で基肥9kg/10a, 追肥6kg/10a)を記録した。家畜ふん堆肥を多量に施用した極多肥条件でも倒れずに、乾物重が多くなることから、家畜ふん堆肥を利用した多肥栽培にも適している。

2) 「べこごのみ」(中込ら2007): 2007年育成, 交配組合せ: ふくひびき/97UK-46

東北地域中南部で「アキヒカリ」より早く, “早生の早”に属する。倒伏に強く, 直播栽培に適している(写真3)。稲WCSとして, 黄熟期のTDN収量は「アキヒカリ」より移植栽培で6%, 直播(表面散播)栽培で5%多収である。玄米は中粒で, 品質は劣り, “下上”である。飼料米と



写真3. 直播栽培での「べこごのみ」の草姿
(秋田県大仙市)

して, 粗玄米収量は650~700kg/10aの期待ができる。

東北地域中北部では, 主食用品種の「あきたこまち」よりも黄熟期が早く稲WCSとして収穫が可能で, 食用品種の収穫作業との分散が期待できる。

3) 「ふくひびき」(東ら1994): 1993年育成, 交配組合せ: コチヒビキ/奥羽316号

主に加工用の多収米品種として育成された。東北地域中南部で“中生の中”に属する。倒れにくく, 直播栽培も可能である。玄米は中粒で, 品質は“中中”である。飼料米として, 粗玄米収量700~750kg/10aが期待できる。1994年に福島県猪苗代町で1,000kg/10a(施肥量:窒素成分で基肥8kg/10a, 追肥4kg/10a)に達した事例がある。

4. 飼料稲の栽培法の基本

飼料稲栽培の基本は食用水稻と同じであるが, 食用水稻に比べて収益性が劣ることから, 飼料稲専用品種の多収性を活かし, 多肥栽培としながら省力・低コスト化に努めることがポイントとなる。そのためには, 耐倒伏性や苗立ち特性に優れた飼料稲専用品種が育成されており, 省力, 低コストにつながる直播栽培を積極的に導入することが大切である。また, 飼料稲では多収のために窒素供給量を食用米品種の1.6~2倍とする必要が

あるので（独）農研機構2009），家畜ふん堆肥を活用した資源循環型の肥培管理を行うことが、経営上合理的である。特に稲WCS用稲のように地上部全体を圃場外に持ち出す場合は、有機物の還元が不十分となる（住田ら2005）。従って、堆肥の還元により地力保全に努める必要がある。さらには堆肥の肥効を利用しながら省力的な肥培管理を行うために、緩効性の被覆尿素を活用することが有効な手段となる。

5. 家畜糞堆肥と被覆尿素を用いた「べこごのみ」の乾田直播

被覆尿素を利用した省力的な湛水直播（以下、湛直）栽培については、本誌12月号に紹介されているので御覧頂きたい（佐藤2009）。ここでは、作業能率に優れ輪作体系に適した乾田直播（以下、乾直）について、湛直と対照させつつ、家畜糞堆肥連用と被覆尿素の施肥体系による「べこごのみ」の稲WCSおよび飼料米栽培試験を紹介する（関矢ら2009）。

1) 試験の方法

2007年に東北農業研究センター大仙研究拠点水田圃場（灰色低地土）において、家畜ふん堆肥連用条件下で「べこごのみ」の湛直および乾直栽培試験を実施した。湛直ではカルパー粉衣種子で乾籾44kg/haを5月10日に播種し、10日間の落水管理後に入水した。乾直では催芽籾で乾籾53kg/haを4月27日に播種し、25日後に入水した。湛直圃場は堆肥連用5年目、乾直圃場は連用4年目で、牛豚鶏3種混合（6：3：1）の完熟堆肥現物36t/haを毎年施用した。窒素施肥は、湛

直で硫安分施、乾直で被覆尿素主体の施肥とした（表1）。出穂後の積算気温800℃を目安に黄熟期刈り調査、および成熟期に刈り調査を行った。

2) 結果および考察

無窒素施肥における黄熟期窒素吸収量は、堆肥連用により湛直で1.7倍、湛直で1.6倍と大きく増加した（図2）。作付け後の作土の窒素無機化量も堆肥連用により湛直で1.4倍、乾直で1.3倍と増加しており（図3）、堆肥連用による地力増進効果が顕著であった。堆肥連用の効果を反映し、湛




図2. 無窒素栽培区における黄熟期窒素吸収量




図3. 作付け後の作土の窒素無機化量（風乾土4週）

表1. 「べこごのみ」直播栽培試験の試験区構成

播種法	試験区	堆肥施用 ¹⁾	窒素施肥法 (kg/ha)	窒素総量 (kg/ha)
湛水直播	無堆肥区	無し	硫安基肥全層+幼形期+減分期+出穂期 60+20+20+20 kg/ha	120
	堆肥連用区	36t/ha(5年目)	同上	120
乾田直播	無堆肥区	無し	LP70:LP100=2:3基肥全層+分げつ期(硫安) 80+20kg/ha ²⁾	100
	堆肥連用区	36t/ha(4年目)	同上	100
	堆肥連用多肥区	36t/ha(4年目)	LP70:LP100=2:3基肥全層+分げつ期(硫安) 120+20kg/ha ²⁾	140

1) 堆肥は畜種が牛、豚、鶏の3種混合（6：3：1）の二次発酵済みの完熟堆肥を現物で36t/ha連用。

2007年は窒素成分で27.5kg/haを含む。

2) 乾田直播圃場において、入水後の生育量が不足していたため、分げつ期に追肥を実施。

表2. 「べこごのみ」直播栽培試験の結果

播種法	試験区	苗立ち 数 (本/m ²)	苗立ち 率 (%)	稈長 (cm)	穂数 (本/m ²)	黄熟期 乾物重 ¹⁾ (t/ha)	収量 指数 ²⁾ (黄熟期)	成熟期 粗玄米重 ³⁾ (t/ha)	収量 指数 (粗玄米)	窒素 吸収量 (kg/ha)
湛水直播	無堆肥区	121	83	69.5	360	9.5	100	5.6	100	110
	堆肥連用区	91	62	85.6	453	13.3	133	8.3	150	141
乾田直播	無堆肥区	141	81	68.2	253	11.0	109	5.9	106	112
	堆肥連用区	140	80	82.0	361	11.6	115	7.5	135	121
	堆肥連用多肥区	139	79	75.9	338	12.8	125	7.8	139	139

1) 黄熟期乾物収量は、地際から10cm以上の地上部乾物重。

2) 収量指数は湛水直播無堆肥区の黄熟期乾物収量を100とした場合の指数。

3) 成熟期粗玄米重は、水分含量15%換算値。

直、乾直ともに堆肥連用条件で黄熟期乾物収量が増加し、湛直堆肥連用区で13.3t/ha、乾直堆肥連用多肥区で12.8t/haの黄熟期乾物収量を得た(表2)。同様に、粗玄米収量も堆肥連用条件で増加し、湛直堆肥連用区で8.3t/ha、乾直堆肥連用多肥区で7.8t/haの粗玄米収量を得た。乾直ではやや茎数が少なかったため、適切な漏水対策や被覆尿素的側条施肥により茎数を確保できれば、追肥なしでさらに収量が増えると推測した。

以上の結果から、堆肥の活用と被覆尿素を利用した乾直を組み合わせることで、従来の湛直に比べて省力的で窒素施肥量を削減した稲WCS、飼料米栽培が可能である。

6. おわりに

飼料米専用品種は優れた多収性を示しており、この特性を生かして低コストで高い収量を得るためには、耕畜連携による堆肥活用が有効である。さらに被覆尿素を用いた湛直、乾直栽培と組み合わせることで、飼料米の生産コスト低減が期待できる。また、生産現場では、圃場の団地化や機械の共同利用といった地域単位での生産コスト削減の取り組みが重要である。飼料米生産を通じ地域内の稲作農家と畜産農家が連携し、新たな地域の営農戦略へと発展していくことを期待したい。

引用文献

1) 東正昭・斉藤滋・池田良一・春原嘉弘・松本

定夫・井上正勝・小山田善三・山口誠之・小綿寿志・横尾政雄(1994)超多収水稻品種「ふくひびき」の育成, 東北農業試験場研究報告88:15-38.

2) 中込弘二・山口誠之・片岡知守・遠藤貴司・滝田 正・東 正昭・横上晴郁・加藤 浩・田村泰章(2006)直播栽培に適する稲発酵粗飼料専用品種「べこあおば」の育成, 東北農研研報106:1-14.

3) 中込弘二・山口誠之・片岡知守・遠藤貴司・滝田 正・横上晴郁・加藤 浩(2008)東北地域向けの早生の飼料イネ専用品種「べこごのみ」の育成, 東北農研研報109:1-13.

4) (独)農研機構(2009)飼料用米の生産・給与技術マニュアル<第1版>

5) 住田弘一・加藤直人・西田瑞彦(2005)田畑輪換の繰り返しや長期畑転換に伴う転作大豆の生産力低下と土壤肥沃度の変化, 東北農研研報B103:39-52

6) 佐藤雄幸(2009)飼料用「べこごのみ」の被覆尿素を用いた湛水直播栽培, 農業と科学12:5-8.

7) 関矢博幸・西田瑞彦・吉田光二・河本英憲(2009)飼料イネの湛水直播および乾田直播栽培における腐熟度の異なる家畜ふん堆肥の影響, 土肥誌東北支部大会講要:6.