

土壌診断に基づく被覆肥料施肥による ハウス栽培コマツナの減肥高品質化

埼玉県農林総合研究センター 農産物安全・土壌担当

主 任 杉 沼 千 恵 子

1. はじめに

作物中の硝酸イオンは過剰な窒素施肥によって高濃度化することが知られており、環境保全的見地からも硝酸イオン濃度低減化技術が求められている。また、窒素施肥量とグルコース等の品質関連成分濃度の関係が注目されるようになった。

そこで、コマツナのハウス栽培において、土壌診断と被覆肥料の活用による、硝酸イオン濃度低減効果の高い施肥技術の確立を行うとともに、品質関連成分（グルコース、アスコルビン酸）濃度

との関係を調査した。

2. 材料及び方法

(1) 試験場所・土壌条件

埼玉農総研園芸研究所内パイプハウス（細粒褐色低地土）において試験を実施した。

(2) 供試品種

コマツナの供試品種は、夏、春および秋まき栽培では‘ひとみ’（トーホク）を、冬まき栽培では‘夏楽天’（タキイ種苗）とした。

(3) 試験区の構成

表 1. 各試験区における施用資材

| 試験区名 | 施用資材 |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 速効性肥料（対照） | 磷硝安加里 S555 |
| 速効性減肥 ^{a)} | 磷硝安加里 S555（25%減肥） |
| L40被覆 ^{a)} （リニア型40タイプ被覆肥料） | エコロングトータル313-40, 重過リン酸石灰 |
| L40被覆減肥 | エコロングトータル313-40, 重過石（25%減肥） |
| L70被覆（リニア型70タイプ被覆肥料） | エコロングトータル313-40, 重過石 |

a) 速効性減肥区および L40被覆区は夏および冬まき栽培のみで設置

本 号 の 内 容

§ 土壌診断に基づく被覆肥料施肥による ハウス栽培コマツナの減肥高品質化 …………… 1

埼玉県農林総合研究センター 農産物安全・土壌担当

主 任 杉 沼 千 恵 子

§ 肥効調節型肥料を用いた水稻「はえぬき」の全量基肥栽培 …………… 7

香川県農業試験場 生産環境部門

主席研究員 田 辺 和 司

主任研究員 阿 部 政 人*

(*現 香川県農業試験場 府中分場)

表2. 各作期の施用窒素量および算出方法

| 作期 | 窒素量の目安 (kg/10a) | 作付前土壌中無機態窒素濃度 (mg/100g乾土) | 施用窒素量 (kg/10a) |
|-----|--------------------|------------------------------|-------------------|
| 夏まき | 10 | 6.9 | 3.1 |
| 冬まき | 12 | 0.4 | 14.6 |
| 春まき | 15 | 0.2 | 11.8 |
| 秋まき | 15 | 5.6 | 6.4 |

a) 各作期の窒素量の目安から作土 0~10cmにおける作付前土壌中の無機態窒素濃度を引いた量を各作期の施用窒素量とした。

例) 夏まき: 10 (窒素量の目安) - 6.9 (作付前土壌中無機態窒素濃度) = 3.1 (施用窒素量)

速効性肥料を対照とし、表1のとおり試験区を設計した。各作期の窒素量の目安¹⁾を基に、表2のとおり窒素施用量を算出し、各資材の施用量を決定した。被覆肥料の試験区では、各成分の施用量が同量となるよう、重過リン酸石灰を施用して、リン酸を補った。

基肥一回施用の二作連続栽培とし、全ての肥料は、基肥として1作目は種直前に施用した。

(4) 耕種概要

栽植密度は、ベツト幅1m, 6条播き, 株間5cmとした。各作期の栽培期間は表3のとおりであった。

表3. 各作期の栽培期間

| 作期 | は種日 | 収穫日 |
|--------|-------------|-------------|
| 夏まき1作目 | 2005年 7月 1日 | 8月 1日 |
| 2作目 | 8月 3日 | 9月 1日 |
| 冬まき1作目 | 2005年11月29日 | 2006年 2月27日 |
| 2作目 | 2006年 3月 8日 | 4月24日 |
| 春まき1作目 | 2006年 5月11日 | 6月 6日 |
| 2作目 | 6月12日 | 7月 6日 |
| 秋まき1作目 | 2006年 9月12日 | 10月 6日 |
| 2作目 | 10月12日 | 11月13日 |

3. 結果及び考察

(1) 夏まき栽培

1作目のコマツナの収量は、L40被覆区およびL70被覆区で、速効性肥料(対照)区より、やや増加したが、有意な差ではなかった(表4)。硝

酸イオン濃度は対照区の2,441mg/kgと比較し、L40被覆区(2,491mg/kg)以外の他の試験区で約1割低下したが(2,192~2,121mg/kg)、有意差はなかった(表5)。アスコルビン酸濃度は速効性減肥区でやや増加したが、ほとんど差がみられなかった。Brix糖度も、ほとんど差がみられなかった。

2作目の収量はL70被覆区で最も多くなったが、速効性肥料(対照)区の1作目および2作目と比較し、有意な差はなかった(表4)。速効性減肥区およびL40被覆減肥区で収量が低かった。速効性減肥区は速効性肥料(対照)区の1作目と比較し、有意に減収した。硝酸イオン濃度は速効性肥料区が3,001mg/kgで最も高く、速効性減肥区が2,095mg/kgで最も低かった(表4)。また、速効性減肥区以外は1作目より高かった。アスコルビン酸濃度はL40被覆減肥区で最も高く、速効性肥料区で最も低かった。速効性肥料区のアスコルビン酸濃度は、同区の1作目と比較し、有意に低下した。Brix糖度には、ほとんど差がみられなかった。

1作目のL40被覆減肥区、L70被覆区および2作目のL70被覆区は、速効性肥料(対照)区と比較して、有意差はなかったが、収量が増加し、硝酸イオン濃度が低下する傾向がみられ、硝酸イオン低減化に有効と考えられる。

収穫跡地土壌の無機態窒素は、1作後、2作後とも減肥した試験区以外で高かった(表6)。また、速効性肥料(対照)区の1作目と比較し、減肥した試験区の1作目および全ての試験区の2作目で有意に低かった。

被覆肥料のコマツナ1作目栽培期間中の窒素成分溶出率は、L40被覆肥料が73.5%、L70被覆肥料が39.2%で、2作栽培期間中では、L40被覆肥料が90.6%、L70被覆肥料が59.1%であった(表7)。

表4. 基肥一回施用二作連続栽培におけるコマツナの生育

| 作期 | 試験区 | 1作目 | | | | 2作目 | | | |
|-----|---------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 株重(g) | 草丈(cm) | 葉数(枚) | 葉色値 | 株重(g) | 草丈(cm) | 葉数(枚) | 葉色値 |
| 夏まき | 速効性肥料 | 31.0 | 27.6 | 7.4 | 42.0 | 28.5 | 28.4 | 7.4 | 40.5* |
| | 速効性減肥 | 30.1 | 27.8 | 7.4 | 42.1 | 25.9** | 28.1 | 7.2 | 40.6 |
| | L40被覆 | 31.9 | 28.3 | 7.5 | 43.2 | 30.3 | 27.9 | 7.4 | 40.6* |
| | L40被覆減肥 | 31.3 | 27.5 | 7.5 | 42.6 | 25.8 | 27.9 | 7.3 | 40.9 |
| | L70被覆 | 32.3 | 28.8 | 7.8 | 43.2 | 34.8 | 28.6 | 7.7 | 41.2 |
| 冬まき | 速効性肥料 | 61.4 | 27.0 | 8.8 | 44.4 | 75.5 | 25.6** | 12.7** | 39.2** |
| | 速効性減肥 | 54.3 | 26.9 | 8.6 | 46.6* | 83.1 | 26.9 | 12.6** | 40.6** |
| | L40被覆 | 54.9 | 27.7 | 8.5 | 43.1 | 70.8 | 27.3 | 11.2** | 39.9** |
| | L40被覆減肥 | 57.2 | 26.5 | 8.7 | 45.9 | 65.3 | 25.7* | 11.2** | 39.2** |
| | L70被覆 | 56.6 | 26.9 | 9.3 | 45.3 | 67.6 | 28.3** | 10.6** | 43.3 |
| 春まき | 速効性肥料 | 27.3 | 28.2 | 5.9 | 42.9 | 19.8* | 26.8** | 5.0** | 41.6 |
| | L40被覆減肥 | 27.0 | 27.4** | 6.0 | 42.4 | 18.0** | 26.7** | 5.1** | 40.9** |
| | L70被覆 | 22.3 | 26.6** | 5.7 | 42.4 | 20.2* | 27.9 | 5.3** | 41.2** |
| 秋まき | 速効性肥料 | 25.4 | 30.0 | 5.4 | 38.5 | 21.4 | 27.5** | 5.0** | 38.3 |
| | L40被覆減肥 | 26.5 | 30.2 | 5.4 | 36.1** | 17.9** | 26.4** | 4.6** | 36.5** |
| | L70被覆 | 26.1 | 29.7 | 5.5 | 36.6** | 18.0** | 25.6** | 4.5** | 33.8** |

a) 葉色値はコニカミノルタ葉緑素計SPAD-502により測定

** : 各作期において1作目の速効性肥料区と比較し有意差あり (有意水準1%) * : 同 (有意水準5%)

表5. 基肥一回施用二作連続栽培におけるコマツナの収穫時硝酸イオン、アスコルビン酸、グルコース濃度およびBrix糖度

| 作期 | 試験区 | 1作目 | | | | 2作目 | | | |
|-----|---------|------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|------------|
| | | 硝酸イオン (mg/kg) | アスコルビン 酸 (mg/kg) | グルコース (mg/kg) | Brix 糖度 | 硝酸イオン (mg/kg) | アスコルビン 酸 (mg/kg) | グルコース (mg/kg) | Brix 糖度 |
| 夏まき | 速効性肥料 | 2,441 | 548 | — ^{a)} | 3.3 | 3,001 | 441** | — | 3.3 |
| | 速効性減肥 | 2,141 | 576 | — | 3.5 | 2,095 | 489 | — | 3.0 |
| | L40被覆 | 2,491 | 557 | — | 3.2 | 2,783 | 516 | — | 3.2 |
| | L40被覆減肥 | 2,121 | 551 | — | 3.3 | 2,511 | 522 | — | 3.3 |
| | L70被覆 | 2,192 | 548 | — | 3.5 | 2,528 | 486 | — | 3.5 |
| 冬まき | 速効性肥料 | 2,673 | 480 | 6,200 | 4.4 | 430** | 665* | 7,550 | 3.3 |
| | 速効性減肥 | 1,898* | 449 | 5,600 | 4.3 | 130** | 604 | 7,950 | 3.8 |
| | L40被覆 | 1,590* | 370 | 5,050 | 4.1 | 320** | 549 | 6,800 | 3.5 |
| | L40被覆減肥 | 1,120** | 500 | 6,100 | 3.9 | 320** | 632* | 7,400 | 3.6 |
| | L70被覆 | 1,241** | 493 | 5,450 | 4.0 | 369** | 550 | 7,900 | 3.7 |
| 春まき | 速効性肥料 | 3,016 | 528 | 2,200 | 6.5 | 2,093 | 562 | 2,100 | 3.4* |
| | L40被覆減肥 | 1,617* | 610 | 2,400 | 7.1 | 1,157** | 634 | 2,300 | 3.5 |
| | L70被覆 | 1,478* | 592 | 2,750 | 7.3 | 1,828* | 536 | 2,400 | 3.4* |
| 秋まき | 速効性肥料 | 4,698 | 232 | 250 | 2.7 | 2,837 | 411** | 2,350** | 3.5* |
| | L40被覆減肥 | 3,972* | 201 | 290 | 2.4 | 1,292** | 442** | 3,050** | 3.6* |
| | L70被覆 | 4,192 | 212 | 300 | 2.5 | 2,051** | 430** | 2,500** | 3.5* |

a) 夏まき栽培ではグルコース未測定

b) アスコルビン酸濃度およびグルコース濃度は小型反射式光度計 (RQフレックス) により測定

** : 各作期において1作目の速効性肥料区と比較し有意差あり (有意水準1%) * : 同 (有意水準5%)

L40被覆区では、植物体の硝酸イオン濃度が速効性肥料区より増加した。このことは、被覆肥料は窒素成分が徐々に溶出し、植物の生育に合わせて窒素を効かせることができるので、速効性肥料より肥効率が高まった結果と考えられる。肥効率が高まったことで、L40被覆肥料は減肥しても減収せず、また、根からの過剰な窒素吸収が抑えられたので、植物体の硝酸イオン濃度は低減したものと考えられる。

L70被覆肥料も、L40被覆肥料と同様に肥効率が高まり、減収しなかったものと考えられる。さらに、肥料溶出期間が長期にわたるため、基肥1回施用で2作連作が可能になったと考えられ、結果的に1作当たりの施用量を、速効性肥料の半分にまで減らすことが可能であった。2作連作栽培は、L70被覆肥料の収穫跡地土壌への肥料成分の残存を低減させることにも有効であった。

(2) 冬まき栽培

1作目のコマツナの実量は速効性肥料（対照）区が最も高く、速効性減肥区、L40被覆区で低

表7. 基肥一回施用二作連続栽培におけるコマツナ栽培期間中の被覆肥料窒素成分溶出率の実測値（埋設法による）

| 作期 | 肥料名 | 窒素溶出率(%) | |
|-----|---------|----------|------|
| | | 1作目 | 2作目 |
| 夏まき | L40被覆肥料 | 73.5 | 90.6 |
| | L70被覆肥料 | 39.2 | 59.1 |
| 冬まき | L40被覆肥料 | 74.9 | 89.2 |
| | L70被覆肥料 | 41.1 | 65.5 |
| 春まき | L40被覆肥料 | 62.7 | 92.7 |
| | L70被覆肥料 | 43.8 | 69.7 |
| 秋まき | L40被覆肥料 | 69.7 | 82.2 |
| | L70被覆肥料 | 36.6 | 50.1 |

かったが、有意な差ではなかった（表4）。硝酸イオン濃度は、対照区の2,673mg/kgと比較し、それ以外の試験区では約3から6割（1,898～1,120mg/kg）で、有意に低下した（表5）。アスコルビン酸濃度は、L40被覆減肥区およびL70被覆区で、やや高かった。グルコース濃度は速効性

表6. 基肥一回施用二作連続栽培におけるコマツナの実収量地土壌の化学性

| 作期 | 試験区 | 1作目 | | | 2作目 | | |
|-----|---------|----------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------|---------------|
| | | pH(H ₂ O) | EC(mS/cm) | 無機態N(mg/100g) | pH(H ₂ O) | EC(mS/cm) | 無機態N(mg/100g) |
| 夏まき | 速効性肥料 | 6.49 | 1.064 | 12.56 | 6.63 | 0.887 | 4.16* |
| | 速効性減肥 | 6.43 | 0.876 | 4.30* | 6.70 | 0.900 | 1.77* |
| | L40被覆 | 6.50 | 1.063 | 11.00 | 6.65 | 1.005 | 3.37** |
| | L40被覆減肥 | 6.63 | 0.819 | 2.85** | 6.80* | 0.858 | 2.00* |
| | L70被覆 | 6.51 | 0.948 | 7.60 | 6.70* | 0.890 | 3.56* |
| 冬まき | 速効性肥料 | 6.82 | 0.161 | 2.64 | 7.35* | 0.112 | 1.20 |
| | 速効性減肥 | 6.50 | 0.383 | 2.41 | 7.19 | 0.157 | 0.67 |
| | L40被覆 | 6.72 | 0.308 | 4.03 | 7.01 | 0.291 | 1.40 |
| | L40被覆減肥 | 6.74 | 0.225 | 3.22 | 7.11 | 0.152 | 1.03 |
| | L70被覆 | 6.55 | 0.394 | 5.20 | 7.03 | 0.239 | 1.81 |
| 春まき | 速効性肥料 | 6.58 | 0.186 | 4.19 | 6.91* | 0.093* | 1.55 |
| | L40被覆減肥 | 6.79 | 0.179 | 4.17 | 7.03* | 0.083 | 1.87 |
| | L70被覆 | 6.91 | 0.160 | 4.08 | 7.04* | 0.093* | 2.25 |
| 秋まき | 速効性肥料 | 6.17 | 0.429 | 2.94 | 6.29 | 0.526 | 12.52** |
| | L40被覆減肥 | 6.82 | 0.252 | 0.82 | 6.49 | 0.378 | 4.65 |
| | L70被覆 | 6.73 | 0.312 | 1.13 | 6.55 | 0.409 | 6.41 |

a) 作付け前土壌：夏まき栽培時 pH(H₂O)6.35, EC0.68mS/cm, 冬まき栽培時 pH(H₂O)6.53, EC0.11mS/cm, 春まき栽培時 pH(H₂O)7.71, EC0.17mS/cm, 秋まき栽培時 pH(H₂O)6.66, EC0.374mS/cm

**：各作期において1作目の速効性肥料区と比較し有意差あり（有意水準1%） *：同（有意水準5%）

肥料区およびL40被覆減肥区で高かった。

2作目の収量は速効性減肥区で最も多くなったが、有意な差はみられなかった(表4)。また、全ての試験区で1作目より増収した(有意差なし)。硝酸イオン濃度は130~430mg/kgで全体に低く、速効性肥料(対照)区の1作目と比較し有意に低下した(表5)。アスコルビン酸濃度は速効性肥料区で最も高く、L40被覆区およびL70被覆区で低かった。速効性肥料区およびL40被覆減肥区では、速効性肥料(対照)区の1作目と比較し有意に増加した。グルコース濃度は速効性減肥区およびL70被覆区で高かった。Brix糖度にはほとんど差がみられなかった。

夏まき栽培で硝酸イオン低減化に有効であった1作目のL40被覆減肥区、L70被覆区および2作目のL70被覆区は、冬まき栽培においても、減収することなく硝酸イオン濃度が低下しており、冬まき栽培においても有効であった。

収穫跡地土壌の無機態窒素は、1作後、2作後ともL40被覆区およびL70被覆区で、それ以外の試験区より高かったが(有意差なし)、2作後の濃度は低レベルであった(表6)。

被覆肥料のコマツナ1作目栽培期間中の窒素成分溶出率は、L40被覆肥料が74.9%、L70被覆肥料が41.1%で、2作栽培期間中では、L40被覆肥料が89.2%、L70被覆肥料が65.5%であった(表7)。

(3) 春まき栽培

1作目のコマツナの収量はL70被覆区で、速効性肥料(対照)区よりやや減少したが、有意な差はみられなかった(表4)。硝酸イオン濃度は対照区の3,016mg/kgと比較し、それ以外の試験区で約5割、有意に低下した(1,617~1,478mg/kg, 表5)。アスコルビン酸およびグルコース濃度はやや増加したが、有意差はなかった。

2作目の収量はL70被覆区で最も多くなったが、有意な差はみられなかった(表4)。しかし、速効性肥料(対照)区の1作目と比較し、それ以外の試験区で有意に減収した。硝酸イオン濃度は速効性肥料区が2,093mg/kgで最も高く、L40被覆減肥区が1,157mg/kgで最も低く、速効性肥料区と比較して約4割低かった(表5)。L70被覆

区では約1割低かった(1,828mg/kg)。L40被覆減肥区およびL70被覆区では、速効性肥料(対照)区の1作目と比較し有意に低下した。アスコルビン酸濃度はL40被覆減肥区で最も高く、L70被覆区で最も低かった。グルコース濃度は速効性肥料区でやや低かったが、ほとんど差がみられなかった。速効性肥料(対照)区の1作目と比較し、アスコルビン酸およびグルコース濃度に有意差はなかった。Brix糖度は、ほとんど差がみられなかったが、速効性肥料(対照)区の1作目と比較すると、速効性肥料区およびL70被覆区で有意に低下した。

L70被覆区の2作目では、速効性肥料区の1作目と比較し有意に減収したが、春まき栽培の目標収量(1,800kg/10a)は上回っていた(L70被覆区2作目の収量は1,820kg/10a)。春まき栽培においてもL70被覆肥料の2作連続栽培は可能であると判断した。

コマツナの硝酸イオン濃度に基準値は設けられていないが、EUにおけるハウレンソウの基準値であり、目黒ら²⁾が北海道における夏どりハウレンソウの内部品質指標の目標値とし、かつ伊達ら³⁾が春作軟弱野菜の目標値とした3,000mg/kgを下回ることができる施肥技術が、夏まき、冬まきおよび春まき栽培において明らかになった。

収穫跡地土壌の無機態窒素は、1作後では試験区間でほとんど差がみられず、2作後ではL70被覆区でやや高かったが、有意な差ではなかった(表6)。

被覆肥料のコマツナ1作目栽培期間中の窒素成分溶出率は、L40被覆肥料が62.7%、L70被覆肥料が43.8%で、2作栽培期間中では、L40被覆肥料が92.7%、L70被覆肥料が69.7%であった(表7)。

(4) 秋まき栽培

1作目のコマツナの収量は、試験区間でほとんど差がみられなかった(表4)。硝酸イオン濃度は速効性肥料(対照)区の4,698mg/kgと比較し、その他の試験区で約1.5割低下した(4,192~3,972mg/kg, 表5)。L40被覆減肥区では、有意に低下した。アスコルビン酸濃度、グルコース濃度およびBrix糖度には、ほとんど差がみられな

かった。

2作目の収量は速効性肥料区で最も多くなったが、有意な差はみられなかった(表4)。しかし、L40被覆減肥区およびL70被覆区では、速効性肥料(対照)区の1作目と比較し有意に減収した。

硝酸イオン濃度は、速効性肥料区で最も高かった(2,837mg/kg, 表5)。L40被覆減肥区(1,292mg/kg)およびL70被覆区(2,051mg/kg)では、速効性肥料(対照)区の1作目と比較し有意に低下した。アスコルビン酸濃度およびBrix糖度には、ほとんど差がみられなかった。グルコース濃度はL40被覆減肥区で最も高かった。速効性肥料(対照)区の1作目と比較するとアスコルビン酸濃度、グルコース濃度およびBrix糖度は有意に増加した。

L70被覆区では、硝酸イオン濃度は、伊達ら³⁾が秋作軟弱野菜の目標値とした4,000mg/kgを超えており、速効性肥料(対照)区の1作目と比較し有意差もなく、硝酸イオン低減効果は不十分であった。L40被覆減肥区の硝酸イオン濃度は3,972mg/kgで、速効性肥料(対照)区と比較し約1.5割、有意に低下したので、秋まき栽培における硝酸イオン濃度低減化には、L40被覆肥料の減肥栽培が有効と判断した。しかし、4,000mg/kgをわずかに下回ったにすぎないので、本作期での硝酸イオン低減化は、減肥率を上げるなど、さらに検討が必要と考える。

収穫跡地土壌の無機態窒素は、1作後、2作後とも速効性肥料区で高かった(表6)。

被覆肥料のコマツナ1作目栽培期間中の窒素成

分溶出率は、L40被覆肥料が69.7%、L70被覆肥料が36.6%で、2作栽培期間中では、L40被覆肥料が82.2%、L70被覆肥料が50.1%であった(表7)。

4. おわりに

ハウス栽培コマツナにおいて、春、夏および冬まき栽培では、リニア型40タイプ被覆肥料の25%減肥栽培またはリニア型70タイプ被覆肥料の基肥一回施用二作連続栽培、秋まき栽培では、リニア型40タイプ被覆肥料の25%減肥栽培により、速効性肥料を用いた場合と比較して減収をとまわずに、植物体中の硝酸イオン濃度を低減できることが明らかとなった。また、アスコルビン酸濃度およびグルコース濃度は硝酸イオン濃度が低いほど、高まる傾向がみられ(図1, 2)、硝酸イオン低減化に有効な施肥条件は、品質向上にも有効であることが明らかとなった。

なお、栽培に被覆肥料を用いた際には、土壌中の肥料粒中に肥料成分が残存している可能性があるため、次作栽培開始までに、肥料成分溶出期間に相当する間隔を空け、成分を完全に溶出させてから土壌診断を行い、施肥設計を行う必要がある。

5. 引用文献

- 1) 山崎晴民(2005):ハウレンソウ,コマツナの硝酸含量の時期別実態と施肥管理による低減化. 埼玉農総研研報4, 25-31
- 2) 目黒孝司ら(1991):夏どりハウレンソウの内部品質指標. 土肥誌62, 435-438
- 3) 伊達ら(1980):野菜の硝酸根蓄積に及ぼす肥培管理の影響. 東京農試研報13, 3-13




図1. ハウス連続栽培におけるコマツナの可食部硝酸イオン濃度とアスコルビン酸濃度の関係




図2. ハウス連続栽培におけるコマツナの可食部硝酸イオン濃度とグルコース濃度の関係