

## 水稲苗の苗床への竹粉末の利用 — 利点と問題点 —

九州大学院 農学研究院

山 川 武 夫

### はじめに

竹は年間平均気温が10℃以上で最寒月の平均気温が-1℃以上の地域、すなわち北緯40度付近から南緯40度付近の地域に自生する植物である。また、農林水産省林野庁の平成19年の森林資源現況統計の竹関係資料（林野庁，2014）によると日本全国の竹林面積は約15.9万haで、侵入率25%以上の竹林を含めると約41万haと推定されている。そのうち九州地方の竹林面積は約5.7万haであり、全国の約36%を占め、現在プラスチック製品等の代替品の出現、タケノコや竹製品の大量輸入や竹生産者の高齢化などの理由により需要が激減したために放置される竹林が増えている。その中で、森林保護のために竹林を伐採する活動が全国で盛んであるが、伐採後の利用がないので竹は産業廃棄物として焼却処分されている。

しかし近年、伐採した竹を圧縮、混練、破碎して繊維状に加工することができるラブマシーン（西邦機工株式会社）が開発され、竹パウダー（商品名：ラブバンブー）が農業の分野で積極的に活

用されるようになってきた。竹粉末を有機物資材として農業に利用する際、作物の病害虫や雑草の種子の混入の心配はない。また、竹粉末は軽量でピートモスと同様に保水性に優れている。このような特徴を持った竹粉末の水稲の育苗床への利用を試みた。その結果、灌水頻度の軽減や苗箱の軽量化を実現し、増収効果も期待できる結果を得ている。我々が実践した例を以下に紹介する。

水稲育苗床に有機物を使用する試みが多くなされている中で、有機物資材として様々な起源のものが使用されているが、我々は環境破壊が進んでいる竹林の竹材を有効利用する目的で、孟宗竹を育苗床に利用しやすい大きさまで粉末状に加工した竹粉末（ラブバンブー）を用いた。竹粉末の利点として、一般に培土として用いられている黒粒培土に比べて保水力が高いことである。しかし、黒粒培土は少量の肥料成分を含んでいるが、竹粉末はほとんど含有していない。竹粉末を用いて育成した水稲苗の生育特性を明らかにし、竹粉末育苗床の利点と問題点について考察する。

### 本 号 の 内 容

#### § 水稲苗の苗床への竹粉末の利用 — 利点と問題点 — ..... 1

九州大学院 農学研究院

山 川 武 夫

#### § 飼料用米「べこあおば」に対する 肥効調節型肥料の減肥効果 ..... 9

元農研機構 東北農業研究センター  
水田作研究領域

土 屋 一 成

## 1. 竹粉末を用いた育苗と移植後の竹粉苗の生育実験方法

試験場所：福津市

苗の育苗：播種は以下の苗床に2011年5月20日に行い、6月18日に水田に移植した。

対照苗：黒粒培土を厚さ10mmに敷き、その上に籾を播種し、上土として黒粒培土を10mmの厚みに被覆し、必要に応じた灌水下で育苗した。

竹粉苗：苗床にラブバンブーを厚さ10mmに敷き、その上に籾を播種し、上土として黒粒培土を10mmの厚みに被覆し、必要に応じた灌水下で育苗した。

育苗の間に、葉色（SPAD値）と最大葉身長を記録した。移植時に植物体の乾物重を地上部と根部に分けて測定した。水田へ移植後7週間にわたって、ほぼ1週間毎に最大葉身長とSPAD値を各5個体について測定した。また、移植後27日目と48日目に分けつ数を5個体について調査した。得られたデータは、多元配置分散分析法により統計処理を行い、処理間の有意差検定は

Tukey法により行った。

## 結果と考察

育苗期間中、対照苗は毎日2回の灌水が必要であったが、竹粉苗は2日に一度で十分であった。降雨の翌日灌水をせずに放置したとき対照苗は萎れ

表1. 移植時の苗の各部位の乾物重 (mg/plant)


水稻苗	根	地上部	植物体
対照苗	16.47 b	28.98 a	45.45 a
竹粉苗	34.63 a	15.98 b	50.61 a

同じ列での異なるアルファベットは、多元配置分散分析法 (Turkeyの有意差検定) により5%水準で有意であることを示す (n=10)

表2. 育苗中と移植後のSPAD値、最大葉身長と分けつ数の推移

月日	移植後 の日数	SPAD値		最大葉身長 (cm)		分けつ数 (本/株)	
		対照苗	竹粉苗	対照苗	竹粉苗	対照苗	竹粉苗
6月4日	-14	22.1 a	21.6 a	—	—	—	—
6月14日	-4	21.6 a	18.6 b	—	—	—	—
6月19日	1	16.0 a	14.3 b	—	—	—	—
6月25日	7	17.3 a	14.5 b	7.3 a	7.5 a	—	—
7月3日	15	33.6 a	33.5 a	16.5 a	14.0 b	—	—
7月8日	20	38.8 a	38.2 a	17.0 a	16.4 a	—	—
7月15日	27	39.0 a	39.2 a	22.9 a	22.0 a	21.2 a	25.0 a
8月5日	48	36.2 a	34.3 a	43.2 a	41.6 a	35.8 a	32.2 a


表中の異なるアルファベットは、各日時での対照区と試験区の値が多元配置分散分析法 (Turkeyの有意差検定) により5%水準で有意であることを示す (n=5)



左側の対照苗は、黄化葉が目立ち、苗の痛みが目立つが、右側の竹粉苗は健全な苗である。

写真1. 育苗期間中の降雨2日後の生育状況

が目立ったが、竹粉苗は正常であった (写真1)。根の発育は、竹粉苗で旺盛 (写真2) であり、AとCを比較するとCで根毛の発生が確認できる。移植時の各部位の乾物重 (表1) は、竹粉苗で地上部の生育が抑制され、根の生育が旺盛となった。植物体の重量は竹粉苗が勝った。また、移植時の苗の取り扱い、試験区の方が丈夫な苗に育苗容易であった。移植後2週間の時点では最大葉身長が試験区で有意に劣ったものの、その後はSPAD値も最大葉身長とも試験区と対照区の間で有意な差は見られなかった (表2)。また、分けつ数も移植後4週間の時点で対照区と試験区の間で有意な差が無く、7週目でも有意な差は見られなかった。



A & B : 黒粒培土のみで生育させた対照苗の根の生育状況 (播種20日後)  
C & D : 黒粒培土の下に竹粉末を敷いた竹粉苗の生育状況 (播種20日後)  
E & F : 対照苗の根の生育状況 (播種26日後)  
G & H : 竹粉苗の根の生育状況 (播種26日後)

写真2. 対照苗と竹粉苗の根の生育状況

すなわち、保水力の高い竹粉末を使用すると灌水のための労力を軽減でき、水不足による苗の劣化を防ぐことが可能である。また、作成した苗床は黒粒培土の半量を竹粉末に置き換えて軽量化したため、運搬の労力が軽減化できた。さらに、苗床の下部に竹粉末のみを加えたので、根域下部の養分濃度が低下したためか根の発育が良くマット状に張り、移植時に安定した植え付けが可能であると考えられた。

## 2. 竹粉末を用いた育苗が水稻苗の形状に及ぼす影響

### 実験方法

試験場所：福津市

苗の育苗：播種は以下の苗床に2013年5月16日に行った。

対照苗：黒粒培土を厚さ10mmに敷き、その上に籾を播種し、上土として黒粒培土を10mmの厚みに被覆し、必要に応じた灌水下で育苗した。

竹粉苗：苗床にラブバンブーを厚さ10mmに敷き、その上に籾を播種し、上土として黒粒培土を10mmの厚みに被覆し、常法に従って育苗した。

PSI苗：苗床にPSI(ポリシリカ鉄)で処理したラブバンブーを厚さ10mmに敷き、その上に籾を播種し、上土として黒粒培土を10mmの厚みに被覆し、常法に従って育苗した。

調査内容：28日苗を各育苗箱より3連(10個体)でサンプリングし、地上部の長さ、根の長さを測定後、その形態を写真に収める。別に3連(100~150個体)をサンプリングし、地上部と根に解体後、凍結乾燥し乾物重を測定した。PSIは、一般に水処理用凝集剤として用いられており、藻類や有機色度成分を確実に凝集することが知られている。PSIを使用した後に発生する浄水発生土を水稻栽培における育苗培土の原料として、または土壤に直接施用することによって様々な好影響を

与えるという結果を得たとの報告がある。また、有機質材料にPSIを添加して発酵させると腐植の生成が多くなることも知られている。竹粉末にPSIを添加することで水稻苗の生育を促進することを期待してPSI苗の試験も試みた。

### 結果と考察

28日苗の根長及び地上部の長さや乾物重は、表3に示す通りであり、地上部の長さや大きな差はなく、竹粉苗とPSI苗が対照苗よりも長く、各苗の根の乾物重は、竹粉苗で特に大きく、地上部の重さはPSI苗で劣っていたが、対照苗と竹粉苗で差が見られなかった。苗自体の重さも竹粉苗が最も大きかった。各部位の割合を見ると、竹粉苗の根の割合が特に大きい。写真3は長さを測定後に10個体を纏めて比較した写真である。これまでにやってきた試験結果と合わせると、竹粉末を用いた育苗は、根の成長を促進する効果を持つことが明らかになった。竹粉苗の地上部の長さが対照苗のそれより長いものの、地上部の乾物重が対照区のそれと差がないことは(表3)、竹粉苗が徒長

表3. 各苗床で育苗した水稻苗(28日齢)の長さや乾物重

水稻苗	長さ(mm)		重さ(mg/個体)		重さの相対値	
	根	地上部	根	地上部	根	地上部
対照苗	63.9 b	103.0 a	8.07 b	13.98 a	36.6	63.4
竹粉苗	84.1 a	99.8 a	14.07 a	13.94 a	50.1	49.3
PSI苗	83.8 a	89.0 c	7.58 b	11.26 b	40.2	59.8

表中の長さは10個体の平均値、重さは100~150個体の3連の平均値を示す。相対値は、植物体全体の重さを100とした時の値を示す。同じ列での異なるアルファベットは、多元配置分散分析法のTurkeyの有意差検定により5%水準で有意であることを示す(n=3)




写真3. 2013年度に育苗した28日苗の形状の比較

しているわけではないと考えられる。

### 3. 竹粉末を用いた育苗がジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）に対する食害抵抗性の評価（ポット試験）

#### 試験方法

**試験場所：**九州大学農学部貝塚圃場に隣接する網室で行う。

**苗の育苗：**前述で育苗した苗を用いた。

**食害の調査：**1/2000アールのワーグネルポットに九州大学付属農場の水田土壌を10kg乾土相当量を充填し（2013年6月6日）、化成肥料（JAむなかた専用48号）1gを充填土壌の上層10cmに混合（6月12日）し、水深が2cmになるように灌水した。6月13日に28日苗を1株3本植でポット当たり計6株を移植した。以下の3区を各3連で設けた。移植後ジャンボタニシをポットあたり2頭放った。6月14日の9時と15時に茎の部分で切断されていない個体数をカウントし残存率（%）を求めた。

**PSI区：**対照苗を3株とPSI苗3株を同一ポットに移植した。

**竹粉区：**対照苗を3株と竹粉苗3株を同一ポットに移植した。

#### 結果と考察

表4に示す通り、対照苗とPSI苗を一緒に植えたPSI区では、若干では有るがPSI苗の残存率が高い結果となった。しかしながら、対照苗と竹粉苗を一緒に植えた竹粉苗の残存率は高く、移植24時間後には対照苗の残存率との差が大きくなった。このことは、竹粉を用いて育苗した水稻苗はジャンボタニシによる食害を受けにくいことを示す。この理由として、病害虫抵抗性が水稻苗のケイ酸含有率と正の相関が言われており、水稻苗

のケイ酸含有率の上昇がジャンボタニシの食害を抑制すると試験開始当初考えていた。しかし、2012年度に苗のケイ酸含有率を測定したところ対照苗の方が竹粉苗より含有率が高く、竹粉苗の食害抵抗性の増加は、他の原因によると考えられた。その原因については現在不明である。

### 4. 竹粉末を用いた育苗が水稻の生育と収量に及ぼす影響（圃場試験）

#### 試験方法

**試験場所：**福岡県福津市の西原農園の水田にて行った。

**苗の育苗：**前述と同様に2013年5月16日に播種して育苗した苗を用いた。

**試験区の設計：**試験区の耕種概要は以下の通りであった。対照苗区、竹粉苗区、PSI苗区を設け、それぞれの試験区に対応する苗を6月19日に移植した。試験圃場施肥は全て同様に行い、元肥としてJAむなかた専用48号（窒素：リン酸：カリ＝16：16：16）を10アール当たり30kg（施肥基準35kg）を6月13日に全層施肥し、追肥としてNK2号（窒素：リン酸：カリ＝16：0：16）を10アール当たり10kg（施肥基準15kg）を8月10日に施肥した。

**生育調査：**移植後定期的に最大葉身長、最大葉身のSPAD値、分けつ数を測定した。止葉が出現した8月22日以降は、止葉の葉身長、葉幅、SPAD値を測定した。9月5日に対照区と試験区Aから平均的な生育の株を3株選び、株の中心の20cmの深さで土とともに根を掘り上げた。株の中間と畝方向に10cmの距離を取りブロックとして掘り上げ、大半の土を水田の中で洗い落とし、低温（4℃）で保存した。翌日、分けつ数をカウントして個々の分けつを分け、根の発生部で稈と根に

わけた。地上部は、稈+葉鞘と葉に分けた。各部位は-20℃で保存し、凍結乾燥した。乾燥試料はサイクロテック粉碎機で粉碎し分析用試料とし、乾式灰化後に重量を測定して求めた灰分含有率とケイ酸含有率（吉田・岡部、1980）を測定した。

表4. ポットを用いた食害試験での植物体個体の残存率（%）

処理区	移植苗	18時間後		24時間後	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
PSI区	対照苗	29.6	21.0	14.8	11.4
	PSI苗	22.2	18.1	11.1	9.1
竹粉区	対照苗	29.6	27.7	18.5	18.9
	竹粉苗	63.0	27.7	51.9	26.2

**収量調査：**各試験区より連続する2列×5株を地表より3cmの高さで刈り取り、それを6等分して、わら重、穂重および収量構成要素（穂数、一穂粒数、登熟歩合、千粒重）について調査した。わら、穂の一部については70℃の通風乾燥機で数日間乾燥して乾物重を秤量し、乾燥試料はサイクロテック粉砕機で粉砕し分析用試料とした。分析用試料を3連で採取し、サリチル酸-硫酸・過酸化水素水法（大山ら，1991）に従って分解したのち、窒素をインドフェノール法（Cataldo et al., 1974）、リン酸をアスコルビン酸法（南條，1990）、カリを原子吸光分析法（波多野，1990）で含有率を定量した。この値と各部位の乾物重との積から窒素、リン酸、カリの集積量を求めた。また、玄米について窒素含有率のみを測定し、その値に5.95の係数を掛けてタンパク質含有率を求めた。

**結果と考察**

**試験圃場の特徴**

試験圃場の土壌は、中粗粒灰色低地土に分類され、土性はLSC（砂質埴壤土）で、通気性に優れているものの、砂の割合が50%程度と高く保肥力が低い土壌である。また、圃場の施肥管理も施肥基準以下に管理された水田であり、玄米窒素を低く維持することを念頭に管理された圃場を試験圃場として選択した。

**生育に及ぼす影響**

図1に最大葉身と止葉の葉色（SPAD値）の経時的変化を示す。最大葉身のSPAD値に処理区間に有意な差は見られなかった。止葉のSPAD値は竹粉苗区で高く推移する傾向にあった。葉色を低下させるほどの影響は竹粉苗で見られず、穂ばらみ期以降の葉色は幾分高くなり、後述する乾物生産を増加させたと考えられた。

図2には最大葉身と止葉の長さの経時的変化を示す。処理区間に有意な差はなく推移していた。これは、竹粉苗では無機態窒素の供給が半分程度になるにもかかわらず、初期生育に全く影響を及ぼさなかったことを示す。




図1. 各処理区の最大葉身/止葉のSPAD値の推移





図2. 各処理区の最大葉身/止葉の葉身長の推移



図中の同じ移植後日数での異なるアルファベットは、多元配置分散分析法 (Turkeyの有意差検定) により5%水準で有意であることを示す (n=3)

図3. 各処理区の止葉の葉幅 (mm) の推移

図3には止葉の葉幅の変化を示す。葉幅の経時的変化は、生育に伴って増加傾向に有り、对照苗区に比べ竹粉苗区とPSI苗区で有意に大きかった。このことは乾物生産に有利である。

図4に分げつ数の継時的変化では、竹粉苗区は対照苗区に比べ分げつが多く推移していた。穂ばらみ期には、対照苗区と比べ有効分げつ数が多く、無効分げつ数が少ない傾向にあった。このことは、竹粉末を用いた水稻苗が増収傾向を示した結果(表7)と一致する。

本年度の試験では、地力の高くない圃場での試験を考慮して、レンゲを緑肥として用いたため、試験圃場の地力が中レベルにあるものと想定して試験を実施した。対照苗区と竹粉苗区の穂ばらみ期での植物体の乾物集積量と根の成長を比較するために、9月5日に各区より3株をサンプリングした。根を洗浄する時点で竹粉苗区の根を中心と

した土塊の周囲の土が落ちにくい傾向を示し、根の乾物重(表6)を見ると有意に竹粉苗区の根重が大きかった。これは根の張り方が、竹粉末を用いた育苗で促進された結果であると判断した。

穂ばらみ期時点での有効分げつ数に、処理区間で有意な差は認められなかったが、竹粉苗区で有効分げつ数が多く、無効分げつ数が少ない傾向を示した。他の要素については大きな差は認められなかった。これは、中程度の地力を考慮した施肥によって移植後に無機態窒素の過不足が生じず、初期生育が旺盛に進み、根の成長も促進された結果と判断した。したがって、竹粉末を用いた育苗で収量を確保するためには、2012年度に行った試験で移植時の施肥レベルを低下させると減収したものの、本年度のような適切なレベルでの窒素施肥は、根張りが良くなり、穂ばらみ期以降の生育を促進した結果、収量が増加する傾向(表7)を示すと考察した。

根域が拡大した結果、根域の無機栄養を多く吸収したと考え、灰分とケイ酸の含有率を測定し、その結果を表6に示した。しかしながら、灰分含有率は対照区の方が高かった。その原因は、竹粉苗区でケイ酸含有率が低下したためであった。一般に、稲のケイ酸含有率が低下すると稲の機械

的強度が低下し、受光体勢が悪くなり収量が低下すると考えられているが、本試験の結果は増収をもたらした。観察結果から竹粉苗区の稲体の受光体勢が悪いとは判断できなかった。この原因の究明は今後の課題である。




図4. 各処理区の株あたりの分げつ数の推移

表5. 2013年度の穂ばらみ期(移植後77日, 9月5日)の生育調査

処理	乾物重(g/株)				分げつ数(本/株)		草丈(cm)
	根	稈	葉身	穂	有効	無効	
対照苗区	21.1 b	37.5 a	14.9 a	12.0 a	29.0 a	4.0 a	102.2 a
竹粉苗区	38.2 a	38.7 a	16.8 a	11.1 a	35.0 a	2.7 a	101.3 a

同じ列での異なるアルファベットは、多元配置分散分析法のTurkeyの有意差検定により5%水準で有意であることを示す (n=3)

表6. 穂ばらみ期の止葉, 葉身, 茎のケイ酸と灰分含有率(%)

処理区	灰分			ケイ酸			その他灰分		
	止葉	葉身*	茎	止葉	葉身*	茎	止葉	葉身*	茎
対照苗区	11.36 a	10.67 a	8.66 a	6.25 a	4.79 a	2.94 a	5.11 a	5.89 a	5.72 a
竹粉苗区	8.63 b	8.40 b	7.46 b	3.46 b	2.74 b	1.87 b	5.17 a	5.66 a	5.58 a

葉身\*は、葉身のうち使用を含まない部分をさす。その高い分は、灰分含有率からケイ酸含有率を差し引いたものでケイ酸以外の無機含有率を示す。同じ列での異なるアルファベットは、多元配置分散分析法のTurkeyの有意差検定により5%水準で有意であることを示す (n=3)

表7. 育苗床に竹粉末を使用した場合の乾物生産と収量構成要素に及ぼす効果

処理区	稈長+穂長 cm	穂数 本/m <sup>2</sup>	一穂粒数 粒	登熟歩合 %	千粒重 g	収量 kg/10a	玄米タンパク質 含有率 (%)
対照苗区	96.3 a	402.6 b	73.3 a	70.1 a	22.9 a	473.9 a	5.56 a
竹粉苗区	97.0 a	503.7 a	71.4 a	67.1 a	22.7 a	548.1 a	5.81 a
PSI苗区	95.3 a	393.7 b	72.5 a	65.9 a	22.7 a	427.1 a	5.35 a

千粒重, 収量及び玄米タンパク質含有率は, 15%水分含有とする。同じ列での異なるアルファベットは, 多元配置分散分析法のTurkeyの有意差検定により5%水準で有意であることを示す (n=3)

表8. 収穫期の地上部の養分集積量と各部位の乾物重

試験区	養分集積量 (kg/10a)			乾物重 (kg/10a)		収穫 指数
	窒素	リン酸	カリ	わら	籾	
対照苗区	11.48 ab	6.58 ab	14.28 ab	687.8 a	638.6 b	0.48 a
竹粉苗区	14.30 a	7.94 a	17.72 a	752.1 a	728.9 a	0.49 a
PSI苗区	8.65 b	5.10 b	11.94 b	548.6 a	491.8 c	0.47 a

同じ列での異なるアルファベットは, 多元配置分散分析法のTurkeyの有意差検定により5%水準で有意であることを示す (n=3)

を得ることが出来る。特に, 収量の増加は期待できないが, PSIを用いることでタンパク質含有率が特に低い玄米を得ることが出来た。玄米のタンパク質含有率と収量は相反することが知られており, 本実験の結果も同じであった。

### 収量とタンパク質含有率に及ぼす影響

各処理区の収量構成要素は, 表7に示す通りであった。竹粉末を用いて育苗した苗を用いた竹粉苗区のわら重が対照苗区のそれより多く, 収量が高い傾向にあった。これは初期生育と分けつが旺盛に進んだためと判断した。その原因として穂ばらみ期までの根張りが対照苗区に比べて拡大したためと考えた。

竹粉末を用いた育苗で収量が増加した理由として上述したように初期生育の促進が大きな理由である。したがって, 竹粉末を用いた育苗の利点を生かし, 増収をはかるためには, 本実験条件のごとく肥沃度を中程度以上に確保することが重要であると判断した。

タンパク質含有率(表7)についてみると, 竹粉末を用いればそれを低下させる効果があるとは言いがたい。玄米のタンパク質含有率を低下させるためには, 施肥窒素の肥効が登熟期に低下するような栽培法が必要であり, 施肥のタイミングと土壤有機物の分解時期に大きく影響を受けると考えられる。ただし, 本試験に用いた栽培法に従えばタンパク質含有率の低い(5.35~5.81%)玄米

### 参 考 文 献

- Cataldo, D. A., Scharader, L. E. and Youngs, V. L. 1974. Analysis by digestion and colorimetric assay of total nitrogen in plant tissues high in nitrate. *Crop Sci.*, 14, 854-856.
- 吉田昌一・岡部達雄 3・19ケイ素, pp.141-143, 作物分析法委員会編 栄養診断のための栽培植物分析測定法, 養賢堂(1980)
- 大山卓爾・伊藤道秋・小林京子・荒木創・安吉佐和子・佐々木修・山崎拓也・曾山久美子・種村竜太・水野義孝・五十嵐太郎 1991. 硫酸-過酸化水素分解法による植物, 堆肥試料中に含まれるN, P, Kの分析. 新潟大学農学部研究報告, 43, 111-120.
- 南條正巳 1990. 22 可給態リン酸. 土壤標準分析・測定法委員会編 土壤標準分析・測定法, p.127-130. 博友社, 東京.
- 波多野隆介 1990. 23 水溶性陽イオン. 土壤標準分析・測定法委員会編 土壤標準分析・測定法, p.135-139. 博友社, 東京.
- 林野庁 2014. 分野別情報. 特用林産物を巡る状況. 竹関係資料.